

Avamys 喷鼻剂分步使用指南

(fluticasone furoate)





喷鼻剂使用前准备：

无论是否是第一次使用喷鼻剂，为确保能充分利用药物，请务必按照以下步骤做用前准备：

1. 盖好瓶盖，用力摇晃喷鼻剂大约10秒钟。Avamys喷鼻液呈浓稠状，经过充分摇均匀后会变成液态，只有处于液态时，方可喷出，因此，该步骤至关重要。
2. 用拇指与食指用力压紧瓶盖两侧，打开瓶盖。
3. 垂直握住瓶身，请勿将喷嘴对准自己。
4. 连续用力按压按钮至少6次，直至喷鼻液呈雾状喷出为止。

现在，您可以使用喷鼻剂了。

每次使用喷鼻剂时

1. 用力摇晃喷鼻剂。打开封盖。把鼻子擤一擤，直至鼻腔干净。接着，头部略前倾。
2. 垂直握住瓶身，把喷嘴放入您的鼻孔内。轻微调整喷嘴位置，勿与鼻中隔相贴。
3. 用鼻孔吸气时，用力按压按钮一次，按压到底。如果用拇指按压有困难，可使用食指、中指或四根手指。
4. 从鼻腔取出喷嘴，用嘴呼气。如果您需要在两个鼻孔内各喷两次，那么请在两个鼻孔内分别按照步骤2和3 进行操作。清理喷鼻剂。盖上瓶盖，竖立存放。

清理喷鼻剂

使用后：

1. 使用洁净干燥的纸巾擦拭喷嘴和瓶盖内侧。请勿用水清洗。
2. 每次用完喷鼻剂后请务必盖好瓶盖。

如果喷鼻剂未达到喷射效果：

- ✔ 请检查瓶内是否还有药物。您可将喷鼻剂放在强光下，透过其“窗口”检查药物的余量。如果余量不足，会影响喷雾效果。请咨询医生再开一瓶喷鼻剂。
- ✔ 检查喷鼻剂是否有损坏。如果您怀疑喷嘴堵塞，请勿使用针或其他尖锐物清理喷嘴。
- ✔ 请按照“喷鼻剂使用前准备”中的说明，重复相关的步骤进行操作。



医生如向患者开出了含有本产品的处方，则应向患者提供本手册。仅限于在医生诊室内使用。欲了解更多信息，请向医生或药剂师进行咨询。如有不良反应，请发送邮件至sg.drugsafety@gsk.com
本资料中的所有图片仅供示范之用。



参考资料：Singapore Avamys Prescribing Information ver IPI09(SI)
SG/FF/0024/17 Certified 31/05/17



欢迎登录网站在线观看
Avamys Nasal Spray
的使用说明视频
<http://www.usingavamys.info>
Password: avamys123