

---

# RECOMMANDATIONS DU CCNI SUR L'UTILISATION DES VACCINS CONTRE LA COVID-19

---

**« LE CCNI RECOMMANDE QUE LES VACCINS CONTRE LA COVID-19 PUISSENT ÊTRE ADMINISTRÉS EN MÊME TEMPS OU À TOUT MOMENT AVANT OU APRÈS D'AUTRES VACCINS\* (Recommandation discrétionnaire du CCNI)<sup>1</sup>. »**

*\* y compris les vaccins vivants, non vivants, avec ou sans adjuvant.*

*Le CCNI a conclu qu'il n'est plus nécessaire d'adopter une approche de précaution dans laquelle les vaccins contre la COVID-19 sont administrés à des moments différents des autres vaccins et recommande que **les vaccins contre la COVID-19 puissent être administrés en même temps (c.-à-d. le même jour), ou n'importe quand avant ou après les autres vaccins (qu'ils soient vivants, non vivants, avec ou sans adjuvant).***

*Le consentement éclairé devrait inclure une discussion sur les avantages et les risques, compte tenu des données limitées disponibles sur l'administration des vaccins contre la COVID-19 en même temps que d'autres vaccins, ou peu de temps avant ou après.*

*Si plusieurs types de vaccins sont administrés lors d'une même visite, ils devraient être administrés à différents sites d'injection à l'aide de matériel d'injection distinct.*


Veuillez consulter la déclaration du CCNI sur le site Web de l'Agence de la santé publique du Canada pour de plus amples renseignements.

## SHINGRIX : POSOLOGIE ET ADMINISTRATION<sup>2</sup>

SHINGRIX est indiqué pour la prévention du zona chez les adultes de 50 ans ou plus<sup>2</sup>.

- SHINGRIX est administré en 2 doses.
- La deuxième dose est administrée de 2 à 6 mois après la première.
- La deuxième dose est importante pour maximiser l'efficacité du vaccin et la durée de la protection.
  - La nécessité de doses de rappel après la primovaccination n'a pas été établie.
- SHINGRIX peut être administré en concomitance avec le vaccin sans adjuvant contre la grippe saisonnière, le vaccin VPP23 ou le vaccin dcaT. Les vaccins doivent être inoculés à des points d'injection distincts<sup>2</sup>.
  - La fièvre et les frissons ont été plus fréquents lorsque le vaccin VPP23 a été administré en concomitance avec SHINGRIX<sup>2</sup>.
- Il n'existe actuellement aucune donnée sur l'administration de SHINGRIX en concomitance avec le vaccin contre la COVID-19 ou à quelque intervalle que ce soit avant ou après celui-ci\*.

Veillez consulter la monographie du produit pour obtenir les renseignements complets sur la posologie et l'administration.



D'après la monographie de SHINGRIX.

Veillez consulter la monographie du produit à l'adresse [gsk.ca/SHINGRIX/MP](http://gsk.ca/SHINGRIX/MP) pour connaître les contre-indications, les mises en garde et précautions, les effets indésirables, les interactions, la posologie et le mode d'administration. Pour obtenir la monographie du produit ou pour signaler un effet indésirable, veuillez composer le 1-800-387-7374.

Visitez le site [PENSEZSHINGRIX.ca](http://PENSEZSHINGRIX.ca) pour en savoir plus.

dcaT = vaccin antidiphthérique, antitétanique et anticoquelucheux acellulaire à contenu antigénique réduit;  
VPP23 = vaccin antipneumococcique polysaccharidique 23-valent.  
\* En date d'octobre 2021.


Références : 2. Monographie de SHINGRIX. GlaxoSmithKline Inc., 3 juin 2020.



**SHINGRIX**  
VACCIN CONTRE LE ZONA (NON VIVANT,  
RECOMBINANT, AVEC AS01<sub>B</sub> COMME ADJUVANT)



Les marques de commerce sont détenues  
ou utilisées sous licence par le groupe de sociétés GSK.  
©2021 Groupe de sociétés GSK  
ou son concédant de licence.



09772  
11/21