



AVF

**Diagnostic
selon
l'ICHD-3
bêta**



Critères diagnostiques de l'algie vasculaire de la face (AVF) selon l'ICHD-3 bêta⁽¹⁾

Nom :

Prénom :

Critères généraux de l'AVF (code IHS 3.1)

- A. Au moins 5 crises réunissant les critères B à D.
- B. Douleur unilatérale sévère ou très sévère, orbitaire, supra-orbitaire et/ou temporale durant 15 à 180 minutes sans traitement.
- C. La céphalée est associée à au moins un des signes suivants :
 - 1. Au moins un des signes ou symptômes suivants survenant du côté de la douleur :
 - a) injection conjonctivale et/ou larmoiement
 - b) congestion nasale et/ou rhinorrhée
 - c) œdème palpébral
 - d) sudation du front et de la face
 - e) rougeur du front et de la face
 - f) sensation de plénitude de l'oreille
 - g) myosis et/ou ptosis
 - 2. Sensation d'impatience ou agitation motrice.
- D. La fréquence des crises varie de une crise, un jour sur deux, à 8 crises par jour pendant plus de la moitié des périodes actives de la maladie.
- E. Ne correspondant pas mieux à un autre diagnostic de l'ICHD-3.

Critères de l'AVF épisodique

- A. Crises répondant aux critères généraux de l'AVF et survenant par périodes.
- B. Au moins deux périodes durant de 7 jours à 1 an (sans traitement) et séparées par une rémission \geq 1 mois.

Critères de l'AVF chronique

- A. Crises répondant aux critères généraux de l'AVF.
- B. Survenant sans rémission ou avec des rémissions durant $<$ 1 mois pendant au moins 1 an.

* IHS: International Headache Society

** ICHD-3: third edition of the International Classification of Headache Disorders

Référence :

- 1- Donnet A. et al. Recommandations pour le diagnostic et le traitement de l'algie vasculaire de la face. Douleurs : Evaluation – Diagnostic – Traitement. 2015 ; 16 (1) : 3-20