

使用説明書変更のお知らせ アラミスト[®]点鼻液27.5 μ g 56噴霧用

グラクソ・スミスクライン株式会社

謹啓 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社製品につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

アラミスト[®]点鼻液27.5 μ g 56噴霧用の噴霧不良を減少させるために、使用説明書を変更いたしますのでご案内申し上げます。

先生方にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1 変更内容


販売名	包装	変更内容
アラミスト点鼻液27.5 μ g 56噴霧用	6g×1	使用説明書の主な変更点 ・「新しい容器を初めて使用する時」の項にイラストを加えステップごとのポイントがわかるように表示 ・1日1回の成人、小児の噴霧数をイラストで分けて表示 ・「よく振る」ことについての説明を追加

■ 使用説明書（変更後）

・「新しい容器を初めて使用する時」の項にイラストを加えステップごとのポイントがわかるように表示

アラミスト点鼻液27.5 μ g 56噴霧用の使い方

新しい容器を初めて使用する時



まず容器をよく振ってください。次にレバーをしっかり6回押ししてください。

2回目からはこの操作は不要です。ただし、5日以上容器のキャップが外れていた場合、または30日以上使用しなかった場合には、この操作が必要となる場合があります。

毎日継続して使用することにより、十分な効果が期待できます。医師・薬剤師の指示のとおり请使用しましょう。

1 使用前に鼻をよくかんでください。

2 容器を矢印の方向によく振ってください。
「よく振る」ことによりサラサラの液体になり、正しく噴霧できます。使用前には毎回、必ずよく振りましょう。

3 水色のキャップのギザギザ部分をつまみながら、ねじらずに持ち上げてください。

4

成人（15歳以上）
1日1回、
左右の鼻の穴に2噴霧ずつ

小児（15歳未満）
1日1回、
左右の鼻の穴に1噴霧ずつ

頭をうつむき加減にし、容器を垂直に立てて鼻の穴に容器の先端を入れ、レバーを最後まで強く押ししてください。

本剤は2歳未満の幼児等に対する安全性が確立していません（国内における使用経験がありません）。

保薬者が噴霧する場合 お子様か自分で噴霧する場合

使用後は、容器の先端とキャップの内部をきれいに拭き、キャップをし、容器を立てて室温で保管してください。

裏面に続く


620000009958

おもて

アラミストを処方された患者の皆様へ

お薬を正しく使用していただくために、以下の事項をお守りください。

●アラミストは、「よく振る」ことによりサラサラの液体になり、正しく噴霧できます。使用前には毎回、必ずよく振りましょう。



2日間放置後の薬液の状態 よく振った後の薬液の状態

●容器を逆さにして使用しないでください。

●容器の先端部分を針などで突くことは絶対にしないでください。（先端の穴が破損し、噴霧できなくなります。）

●ガラス容器を用いているため、衝撃を与えないように取り扱いに注意してください。

※このお薬は、1本（容器）で56回の定量噴霧ができるように設計されています。

●使用後は各自自治体により定められたルールに従って廃棄してください。

パソコン、携帯電話から動画による使用方法などもご覧いただけます。
▶ <http://kusurigsk.jp/AL/>

2次元コードが読み取れない場合は、インターネットに上記アドレスを直接ご入力ください。

アラミスト点鼻液の使用方法に関するお問い合わせは、カスタマー・ケア・センターTEL：0120-56-1087（9：00～18：00／土日祝日および当社休業日を除く）または、医師、薬剤師、看護師にご相談ください。

グラクソ・スミスクライン株式会社
〒151-8566 東京都港区千代田1-9-1 GSKビル

620000009958

うら

・1日1回の成人、小児の噴霧数をイラストで分けて表示

・「よく振る」ことについての説明を追加

2 変更ロット、出荷予定時期

販売名	包装	統一商品コード	変更ロット	出荷予定時期
アラミスト点鼻液27.5 μ g 56噴霧用	6g×1	246752022	HD9K	2017年5月上旬

流通在庫の関係から出荷時期が前後する場合がありますが、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。