

包装変更のお知らせ サムチレール 内用懸濁液15%

グラクソ・スミスクライン株式会社

謹啓 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社製品につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび弊社が販売しておりますサムチレール内用懸濁液15%の包装を変更いたします。

先生方にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

1 変更内容

販売名	包装	変更内容	
		分包	使用説明書
サムチレール 内用懸濁液15%	5mL×14包	・開封口 (開封方法および表示)	・分包の開封方法

■ 分包

開封口の仕様を変更し開封方法についての説明を追加いたします。

変更前

変更後



・分包サイズの変更はありません。

裏面もご覧ください▶

■ 使用説明書

分包の開封方法変更に伴い、使用説明書を変更いたします。

変更後の使用説明書

サムチレール内用懸濁液15%

このお薬の開け方と飲み方

このお薬は1包中に5mL入っています。
医師が指示した用法・用量を守り、正しく服用してください。
1回分(1包中5mL)を切り離し、
下の図のように開封して服用ください。

1 開封する前に点線で囲んだ部分を指で軽くつまみ、中にたまっているお薬を下の方に落とします。

2 お薬を開けるときは、ハサミを使ってゆっくりと図のように切って開けてください。

3 スプーン等にお薬を移して服用してください。直接口にくわえて手で押し出しながら飲むことも出来ますが、切り口で口を傷つけないように注意してください。

or

お薬は手で押し出すなどして、残さないように服用してください。

このお薬は手で開けることも出来ます。

手で開けた場合、切り口がゴザゴザになることがあります。直接口にくわえて飲むときは、口を傷つけないように注意してください。

1 点線に沿って折り曲げてください。Step 1. 折り曲げると切り込みが出ます。

2 切り込み部分から矢印の方向に引いて、上の部分を完全に切り取って開封します。

＜お薬の保管についての注意＞

- ・このお薬は凍結を避け、室温で保存してください。
- ・お薬は、服用する直前に1包ずつ開封してください。

＜お薬の服用についての注意＞

- ・症状が改善しても、医師に指示されたとおり、服用を続けてください。
- ・その他、お薬の飲み方などで不明な点は、医師または薬剤師にご相談ください。

グラクソ・スミスクライン株式会社 62000000025409

・サイズ(210×297mm)の変更はありません。

2 変更ロット、出荷予定時期

販売名	包装	統一商品コード	変更ロット	出荷予定時期
サムチレール 内用懸濁液15%	5mL×14包	246763011	3X9N	2019年7月下旬

流通在庫の関係から出荷時期が前後する場合がありますが、何卒ご了承承のほどお願い申し上げます。