


オルドレブ点滴静注用150mg 調製方法および調製後の注意



ALDREB

調製方法

- 1 本剤1バイアルに注射用水または生理食塩液2mLを加えます。
- 2 ゴム栓内側やバイアル壁面に付着した薬剤も完全に溶かすためにバイアルを逆さまにし、泡立たないように穏やかに溶解し溶解液とします。なお、バイアル壁面などを観察し、不溶の薬剤が残っていないことを確認してください。(溶解液の濃度は75mg(力価)/mL)
- 3 溶解液を生理食塩液等で希釈し、通常50mLの点滴静注用液とします。



調製後

調製後の溶解液は速やかに使用してください。

なお、やむを得ず保存を必要とする場合でも、冷蔵庫(2~8℃)に保存し24時間以内に使用してください。希釈した点滴静注用液は速やかに使用し、残液は廃棄してください。

混注不可

本剤を他の薬剤と配合しないでください。

オルドレブ点滴静注用150mg 製品添付文書 2017年12月作成(第3版)

製造販売元

グラクソ・スミスクライン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1

文献請求先及び問い合わせ先

TEL : 0120-561-007 (9:00~17:45/土日祝日及び当社休業日を除く)

FAX : 0120-561-047 (24時間受付)

ADNPBROC200001-D2011N
作成年月2020年11月(MK)