

クラバモックスを服用されている患者さんへ

投薬瓶用説明書

本剤の正しい使用法を患者さんに理解して頂き、十分な効果を得るために、この説明書を用意しました。



日本標準商品分類番号
876139

β -ラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリン系抗生物質製剤

処方箋医薬品（注意-医師等の処方箋により使用すること） 薬価基準収載

クラバモックス 小児用配合 ドライシロップ

CLAVAMOX Combination Dry Syrup
for Pediatric

シロップ用クラブラン酸カリウム・
アモキシシリン水和物

「効能・効果」、「用法・用量」、「禁忌・原則禁忌を含む使用上の注意」等については添付文書をご参照ください。

グラクソ・スミスクライン株式会社

<クラバモックスを服用されている患者さんへ>

このお薬を正しく服用していただくために


このお薬は、必ず冷蔵庫(冷蔵室)に保管してください。

(お子さんの手の届かない冷蔵庫(冷蔵室)内の場所に保管してください。)

<服用にあたって>

医師が指示した用法・用量を守り、正しく服用してください。

- 1** 服用の前に毎回必ず、
お薬が泡立たない程度に
容器をよく振りまぜます。



- 2** 指示された1回服用量を
容器の目盛り(1回服用分)
で確認し、計量カップや
スポイト等に量り取ります。



- 3** 食事をする際には、
食直前に飲ませてください。
ミルク、乳酸菌飲料の味が
変わったり、沈澱することが
あるので混ぜないでください。

* 1日2回
(朝・夕、12時間毎)

* ____日間

お薬の保管についての注意点

- **このお薬は常に冷蔵庫(冷蔵室)で保管してください。**
- 保管中にお薬が分離することがありますが、効果には問題ありません。
- 保管中にお薬が白色から帯黄白色へと変化することがありますが、効果には問題ありません。
- 医師から指示されたとおりに服用してください。指示された期間を過ぎたお薬は服用しないでください。また、期間を過ぎたお薬は水道水ですすめて流しに捨ててください。

お薬の服用についての注意点

- 症状が改善しても、医師に指示されたとおりに、そのまま服用を続けてください。
- このお薬の服用により便がゆるくなる場合がありますが、腹痛や頻回の下痢が現れた場合は、すみやかに主治医または薬剤師にご相談ください。
- その他、お薬の飲ませ方などでご不明な点は、主治医または薬剤師にご相談ください。

製造販売元

グラクソ・スミスクライン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1

文献請求先及び問い合わせ先

TEL : 0120-561-007 (9:00~17:45/土日祝日及び当社休業日を除く)

FAX : 0120-561-047 (24時間受付)

CMDS0021-P2009N

改訂年月2020年9月(MKT)