

食品に混ぜて服用する場合

注)水に溶かしたお薬の飲み合わせを示したものです。

混ぜると飲みやすくなるもの

特に飲みやすくなるもの

飲みやすくなるもの

オレンジ
ジュース



プリン



ヨーグルト



バナナ
アイスクリーム



チョコレート
アイスクリーム



混ぜると飲みづらくなるもの

アップル
ジュース



ミルク



乳酸菌飲料



●上記の食品とは服用のたびに混ぜ合わせ、ただちに服用してください。

- ストロベリークリーム味のフレーバーです。
- 症状が改善しても、医師に指示されたとおり、そのまま服用を続けてください。
- その他、お薬の飲ませ方などでご不明な点は、主治医または薬剤師にご相談ください。

グラクソ・スミスクライン株式会社

NP-JP-ACA-BROC-190002-P2111N
改訂年月2021年11月(MKT)

クラバモックス®を服用される患者さんへ

このお薬の服用により、
便がゆるくなることがあります

編集協力：慶應義塾大学医学部 客員教授
国立がん研究センター中央病院 感染制御室長/感染症部長
岩田 敏 先生

- 抗生物質は病気を引き起こす悪い菌だけでなく、腸内のバランスを保っている菌も殺してしまうことがあります。このバランスがくずれると下痢の症状をおこしやすくなります。便がゆるくなった場合、以下を参考に対応してください。

下痢ではないが、便がゆるくなった場合

- ▶もう少し様子をみましょう。このお薬を飲みきってください。

1日1～2回程度の下痢の場合

- ▶もう少し様子をみましょう。このお薬を飲みきってください。心配な場合は、自らの判断でお薬を飲むのをやめず、医師に相談してください。

1日4～5回以上、 しかも水のような下痢をしてしまう場合

- ▶このお薬を飲むのをやめて、すぐに医師に相談してください。診察の際に下痢をしてお薬を中断したことを必ず伝えるようにしてください。


グラクソ・スミスクライン株式会社

【分包の場合】


お薬の開封方法



- 1 開封する前に、お薬を指で軽くつまみ上げ、分包を平らなところでトントンと2~3回落とし、分包内のお薬を下にまよめず。



- 2 お薬を開けるときは、飛び散らないように、ハサミを使って、静かに開封してください。



※お薬の袋を手で勢いよくちぎって開けようとすると、お薬が飛び散ることがあります。



服用にあたって

- 1 1回量を空のコップに入れ、水に溶かして速やかに服用してください。

※お薬を粉のまま飲むと、細かな粉末のため、むせることがあります。



飲みきれぬ適量の水を注いでかき混ぜます。

食品に混ぜて服用する場合には、表ページを参考にしてください。

- 開封する前に包数を確認して、開封したお薬は必ず飲みきってください。



【ボトルの場合】

お薬の保管方法

このお薬は、必ず冷蔵庫(冷蔵室)に保管してください。
(お子さんの手の届かない冷蔵庫(冷蔵室)内の場所に保管してください。)

- 保管中にお薬が分離することがありますが、効果には問題ありません。
- 保管中にお薬が白色から帯黄白色へと変化することがありますが、効果には問題ありません。

服用にあたって

- 1 服用の前に毎回必ず、お薬が泡立たない程度に容器をよく振りまぜます。



- 2 指示された1回服用量を容器の目盛り(1回服用分)で確認し、計量カップ等に量り取ります。

