

まぶしい、目が乾く、
顔がピクピクするなどの自覚症状、



もしかしたら 治療の必要な病気が 隠れているかもしれません。

気になる症状がありましたら、早めに専門医に相談しましょう。

がんけん

眼瞼けいれんに よくみられる症状

- 光がまぶしい
- 目が乾く感じがする
- 目を開けているのがつらい
- 意思とは関係なく
目をつぶってしまう
- 片目だけつぶってしまう
- まばたきの回数が多くなった
- 以前のように
自然なまばたきができない
- まぶたがピクピクする
- 点眼治療では改善しない
症状がある
- 目や目の周囲に違和感や
異物感がある
- 口元がピクピクする

へんそくがんめん

片側顔面けいれんに よくみられる症状

- 目を開けているのがつらい*
- 意思とは関係なく
目をつぶってしまう
- 片目だけつぶってしまう
- まばたきの回数が多くなった
- まぶたがピクピクする*
- 目や目の周囲に違和感や
異物感がある
- 顔がひきつったり、
こわばったりして
ゆがんでしまう
- 口元がピクピクする*

*症状は片側のみ

編集協力:医療法人社団済安堂 井上眼科病院 名誉院長 若倉雅登

裏面へ▶

がん けん
眼瞼けいれんとは

自分の意思に関係なく、両目のまわりの筋肉がけいれんし、目が開けにくくなる病気です。

詳しくは患者さん向け小冊子「ほほえみ」のp5～8をご覧ください。

へん そく がん めん
片側顔面けいれんとは

自分の意思に関係なく、顔の片側の筋肉がピクピクする病気です。

詳しくは患者さん向け小冊子「ほほえみ」のp9～12をご覧ください。

眼瞼けいれんがんけんと片側顔面けいれんへんそくがんめんは別々の病気ですので、どちらの病気かは専門医に診断してもらいましょう。いずれも40歳以降の中高齢者に発症することが多く、女性に多くみられます^{1,2)}。眼瞼けいれんがんけんは、しばしばドライアイと似通った自覚症状が出る場合があります。どちらの病気もそのまま放っておいても自然に治る病気ではなく、日常生活に大きな影響をおよぼすことがあります。

1) 日本神経眼科学会眼瞼痙攣診療ガイドライン委員会. 日眼会誌. 2011;115:617-628

2) 日本神経治療学会治療指針作成委員会. 神経治療. 2008;25:478-493

がんけん へん そく がん めん
**眼瞼けいれん、片側顔面けいれんの
診断・治療については当院にご相談ください。**

グラクソ・スミスクライン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1



わかもと製薬株式会社