

患者指導箋



眼瞼けいれん、片側顔面けいれんでボトックスを使用した患者様へ

# ボトックス治療後の 注意点について

## ボトックス治療後の注意点について

- 1 注射当日は注射部位をもまないように注意してください。  
(注射液が拡がるのを防ぐため)
- 2 注射当日はなるべく洗顔を避けてください。夕方の入浴は構いませんが、入浴の際に顔面を触ったり拭いたりするのは最低限にしてください。  
(注射液が必要以上に拡散してしまうおそれがあるため)
- 3 皮下出血が見られたら、座った状態でハンカチの上から数分以上圧迫して止血してください。(まぶたの周りは出血が広がりやすいため。ただし、皮下出血があっても治療効果に差はありません)
- 4 注射直後に体調不良が生じていなければ帰宅後の安静は不要です。
- 5 治療当日には、ほとんど効果は現れません。  
(通常では、2～3日してから、徐々に効果が現れてきます)
- 6 このお薬の効果は通常3～4ヵ月持続しますが、時間が経つにつれて徐々に効果は消失します。ボトックスを再投与することで同様の効果が期待できます。

その他、気になる症状がございましたら、担当の医師にご相談ください。

ボトックス治療を受けた日付	年	月	日
次回の診察日	年	月	日
次回のボトックス治療の目安	年	月頃	

※お薬の効果が切れてから次回治療を行います。症状が再発したら、再注射の時期について担当の医師と相談してください。