

致 已接種羅特律口服液的嬰兒照顧者

# 接種羅特律口服液之後， 請注意以下的症狀



哭鬧不止或心情不暢

反覆嘔吐

倦怠臉色差

便血


接種後(特別是1週內)，若出現上述任何一種或多種症狀，  
則疑似有腸套疊，

## 請盡速就醫

### 何謂腸套疊？

部分腸子套入另一腸子內，造成腸阻塞的高危急性疾病。

是一種0歲兒童容易發生的疾病，與有無接種無關。



一旦發生腸套疊，會造成腸堵塞導致血液不通暢，導致腸組織壞死。

發生腸套疊，一般會從肛門灌入液體(顯影劑、水等)或空氣，利用壓力將腸子推回原位，但是據研究，發病後延誤就醫的時間越長(12小時以上等)，因腸道壞死而需外科手術的情形就越多。

日本國內外的輪狀病毒疫苗上市後調查顯示，接種後發生腸套疊的風險有微增的可能性。  
無論接種次數，每次接種後(特別是1週內)請注意觀察有無出現腸套疊症狀。

【接種日期備忘錄】

( 第1次 · 第2次 )  
月 日

【接種醫院、病院名稱】

- 因疑似腸套疊而前往其它醫療機構就診時，請攜帶本傳單，並告知已接種羅特律疫苗。
- 因腸套疊而前往其它醫療機構就診時，請同時通知接種羅特律口服液的醫療機構。