

Dành cho các bậc cha mẹ có trẻ uống vắc xin ngừa virus Rota (vắc-xin Rotarix)

Cần chú ý các triệu chứng sau ở trẻ sau khi uống ngừa vắc-xin Rotarix




- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Quấy khóc nhiều | <input checked="" type="checkbox"/> Nôn, ói nhiều lần |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mệt mỏi, sắc mặt không tốt | <input checked="" type="checkbox"/> Đại tiện phân có máu |

Sau uống ngừa (**đặc biệt là sau 1 tuần tiêm chủng**) nếu phát hiện trẻ có 1 trong các triệu chứng kể trên thì có thể nghi ngờ trẻ bị lồng ruột

phải nhanh chóng đưa trẻ đi khám.

Bệnh lồng ruột là gì?

Đây là một bệnh lý cần cấp cứu ngay do một phần của ruột chui vào phần ruột khác. Bệnh này thường xảy ra ở trẻ từ 0 tuổi mà không liên quan đến việc tiêm chủng/uống ngừa.



Khi lồng ruột xảy ra, ruột bị tắc, làm giảm lưu thông máu, có thể khiến mô ruột bị chết (hoại tử). Khi bị lồng ruột thường xử lý bằng cách đưa các chất lỏng (như thuốc cản quang hoặc nước) hay không khí vào để đoạn ruột đó quay trở lại vị trí ban đầu. Nếu càng để lâu kể từ lúc có triệu chứng (ví dụ trên 12 tiếng) càng làm tăng nguy cơ phải phẫu thuật do hoại tử ruột.

Theo khảo sát sau khi ra mắt vắc-xin Rotavirus tại Nhật Bản và nước ngoài, nguy cơ mắc bệnh lồng ruột sau tiêm chủng có khả năng tăng nhẹ.

Phải cẩn thận với các triệu chứng của bệnh lồng ruột sau khi tiêm chủng (**đặc biệt là 1 tuần sau tiêm chủng**) bất kể là lần tiêm chủng thứ mấy.

[Ghi chép vào ngày uống ngừa]

(**Lần thứ 1** / **Lần thứ 2**)

Ngày **tháng**

[Tên trung tâm/bệnh viện thực hiện uống ngừa]

- Khi đi khám tại một cơ sở y tế khác do nghi ngờ bị lồng ruột, hãy mang theo tờ rơi này và thông báo về việc con bạn mới được uống ngừa vắc-xin Rotarix.
- Khi đi khám tại một cơ sở y tế khác để điều trị lồng ruột thì cũng thông báo cho cơ sở y tế đó biết con bạn mới được uống ngừa vắc-xin Rotarix.