

Para pais/tutores de bebés que receberam a vacinação (oral) com Rotarix

Fique atento a estes sintomas após a vacinação com Rotarix.



- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Choro repetido com irritabilidade | <input checked="" type="checkbox"/> Vómitos frequentes |
| <input checked="" type="checkbox"/> Perda de firmeza com palidez | <input checked="" type="checkbox"/> Sangue nas fezes |


Caso se aperceba de um dos sintomas acima após a vacinação (**especialmente na semana da vacinação**), pode haver **risco de intussusceção**, pelo que

deve consultar de imediato um médico.

O que é intussusceção?

Ocorre intussusceção quando parte do intestino se dobra penetrando na secção do intestino mais próxima. Trata-se de uma emergência que requer assistência imediata.

A intussusceção é uma patologia comum em bebés com menos de um ano, independentemente de terem sido vacinados ou não.



Quando ocorre intussusceção, o intestino fica bloqueado e a irrigação sanguínea é limitada, o que pode levar à morte de tecido intestinal (necrose).

Em caso de intussusceção, por norma, a administração de líquido (meio de contraste, água, etc.) ou enema de ar permite que o intestino regresse ao normal, mas quanto mais tempo passar após a ocorrência (por exemplo, 12 horas ou mais), maior a probabilidade de cirurgia por necrose intestinal.

Estudos realizados desde o início da venda da vacina contra o rotavírus no Japão e no estrangeiro sugerem que pode haver um risco ligeiramente maior de intussusceção após a vacinação. Recomendamos que esteja atento aos sintomas de intussusceção após a vacinação (**especialmente na semana da vacinação**), independentemente da dose (primeira ou segunda).

Lembrete sobre data de vacinação

1.^a / 2.^a dose

Data:

Clínica/hospital responsável pela administração da vacina

- Se consultar outra clínica/hospital por suspeita de intussusceção, leve este folheto informativo e informe o médico que o seu filho foi vacinado com Rotarix.
- Caso se dirija a outra clínica/hospital por intussusceção, avise também a clínica/o hospital onde o seu filho recebeu a referida vacina.