



レキップ錠 0.25mg・1mg・2mgを 服用される患者さまへ

グラクソ・スミスクライン株式会社

レキップ錠 0.25mg・1mg・2mgを 服用される患者さまへ

**このお薬を正しく使用するため、
飲む前に必ずお読みください。**

**ご自身の判断でお薬の量を増減したり、
中止したりしないでください。**

体調が悪い、気になる症状が出る場合には、
必ず主治医にご相談ください。

ご自身の判断でお薬の量を増減
したり、服用を中止したりしないで
ください。お薬の量を勝手に調節
したり服用を中止したりすると、
症状が悪化したり副作用があらわ
れたりすることがあります。



この説明書には特に注意していただきたい点だけ書いて
あります。

その他、気になる点がございましたら、主治医または薬剤師
にご相談ください。

グラクソ・スミスクライン株式会社

レキップ錠を服用する際の注意事項

自動車の運転、機械の操作、高所作業などはしないでください。

レキップ錠を服用すると急に眠くなったり、何の前ぶれもなく眠りこんでしまうことがあります。自動車の運転、機械の操作、高所作業などをすると事故につながる可能性がありますので、このような作業は行わないでください。なお、ご自身の判断でお薬の量を増減したり、中止したりしないでください。



次のような症状がみられましたら、すぐに主治医または薬剤師にご相談ください。

- 前兆のない眠り込み
- 幻覚や妄想
- めまいや立ちくらみ
- 発熱や意識がぼんやりした状態
- 筋肉のこわばりがひどい状態
- 気を失う
- 衝動制御障害(ギャンブル依存、買いあさり、むちゃ食いなど)



製造販売元 [資料請求・問い合わせ先]

グラクソ・スミスクライン株式会社

〒107-0052

東京都港区赤坂1-8-1

<http://jp.gsk.com/jp/contact-us/>

NP-JP-RPN-PINF-210002-P2109N

改訂年月2021年9月(C)