

致已接种罗特律口服液婴儿的监护人

接种罗特律后请注意以下症状



- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 不断哭闹或心情不佳 | <input checked="" type="checkbox"/> 反复呕吐 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 神态疲乏脸色不佳 | <input checked="" type="checkbox"/> 便血 |


在接种后(尤其是1周内)如果出现上述任一或多项症状, 则有可能是发生了肠套叠,

请立即就诊

什么是肠套叠?

部分肠管套入与其相连的肠腔内的一种紧急性疾病。

该疾病多发于0岁婴儿, 不论其是否已接种疫苗。



如果发生肠套叠, 将导致肠道堵塞、血液难以流通, 甚至可能会出现肠组织坏死的情况。一旦发生肠套叠, 虽然可通过从肛门向肠内注入液体(造影剂或水等)或空气来使其恢复原状, 但一般认为发病后经过的时间越长(例如12小时以上), 因肠坏死而需要接受外科手术的可能性也就越高。

国内外的轮状病毒疫苗上市后调查结果表明在接种后出现肠套叠的风险会略有增加。不论是第几次接种, 在每次接种后(尤其是1周内)请务必注意是否出现肠套叠的症状。

【接种日期记录】

(第1次 · 第2次)
月 日

【接种的医院或诊所名称】

- 如果出现疑似肠套叠症状并在其他医疗机构就诊时, 请携带本彩页, 并告知已接种罗特律。
- 如因肠套叠在其他医疗机构就诊, 请务必告知接种罗特律的医疗机构。

GlaxoSmithKline K.K.