

로타릭스내복액 접종을 받은 아기의 보호자 분께

로타릭스 접종 후에는 다음과 같은 증상에 주의하십시오.




- 울거나 보채는 일이 반복된다.
- 구토를 반복한다.
- 축 늘어지고 안색이 나빠진다.
- 혈변을 본다.

접종 후(특히 1주일간)에 위와 같은 증상이 하나라도 발생한 경우,
장중첩증이 의심되므로

신속하게 병원에서 진찰을 받으십시오.

장중첩증이란?

장의 일부가 장의 다른 부분으로 말려들어가는 긴급성이 높은 질병입니다.
백신 접종의 여부와 상관없이 0세의 아기가 걸리는 경우가 많은 질병입니다.



장중첩증에 걸리게 되면 장이 막혀 혈액의 흐름이 나빠지면서 장 조직이 죽어 가는(괴사) 경우가 있습니다.
장중첩증에 걸린 경우, 일반적으로 항문을 통해 장 내부에 액(조영제나 물 등)과 공기를 넣어 원래 형태로 복구하게 되는데, 발병 후 시간이 경과할수록(12시간 이상 등) 장 괴사로 인해 수술하는 비율이 높아지는 것으로 알려져 있습니다.

국내외에서 진행된 로타바이러스 백신 시판 후의 조사에 따르면, 접종 후에 장중첩증의 위험이 약간 증가할 수 있다고 합니다.
접종횟수와 무관하게 접종 후(특히 1주일간)에는 장중첩증 증상에 주의하십시오.

【접종일 메모】

(1회째 , 2회째)
월 일

【접종을 받은 클리닉·병원명】

- 장중첩증이 의심되어 다른 의료기관에서 진찰을 받으실 때는 이 진단지를 지참하셔서 로타릭스 접종을 받은 사실을 알려 주십시오.
- 장중첩증 때문에 다른 의료기관에서 진찰을 받으신 경우, 로타릭스 접종을 받은 의료기관에도 연락해 주십시오.