

ロタリックス内用液を接種した赤ちゃんの保護者の方へ

gsk

【接種日メモ】

(1回目 ・ 2回目) 月 日



ロタリックス接種後は 下記の症状に注意しましょう

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 泣いたり不機嫌になったりを繰り返す | <input checked="" type="checkbox"/> おう吐を繰り返す |
| <input checked="" type="checkbox"/> ぐったりして顔色が悪くなる | <input checked="" type="checkbox"/> 血便が出る |

接種後（特に1週間）に上記の症状が1つでもみられた場合は、**腸重積症**が疑われるため、

速やかに受診してください

【接種した医院・病院名】


- 腸重積症の疑いで他の医療機関を受診する際は、このリーフレットをお持ちいただき、ロタリックスを接種したことをお知らせください。
- 腸重積症で他の医療機関を受診された際は、ロタリックスを接種した医療機関にもお知らせください。

編集協力：北海道済生会西小樽病院 みどりの里 院長代行 堤 裕幸 先生

腸重積症とは？

腸の一部が腸のほかの部分に入り込んでしまう、緊急性の高い病気です。

ワクチン接種の有無にかかわらず、0歳のお子さんがかかることが多い病気です。



腸重積症になると、腸が詰まって血液の流れが悪くなることで、腸の組織が死んでしまう（壊死する）ことがあります。

腸重積症になった場合、通常は肛門から腸内に液（造影剤や水など）や空気を入れてもとに戻しますが、発症から時間が経つほど（12時間以上など）、腸の壊死のために外科手術になる割合が増えるといわれています。

国内外でのロタウイルスワクチン発売後の調査から、接種後に腸重積症のリスクが少し増加する可能性があると考えられています。接種回にかかわらず接種後（特に1週間）は腸重積症の症状にご注意ください。

グラクソ・スミスクライン株式会社