


## 带状疱疹ワクチン

# シングリックス筋注用を接種した方へ

編集協力：独立行政法人 国立病院機構  
東京病院 臨床研究部長  
永井 英明 先生

グラクソ・スミスクライン株式会社

シングリックスは、2回の筋肉内注射が必要です。



	接種日時	医療機関名
1回目	年 月 日 時 分	
2回目	年 月 日 時 分	

シングリックスは、  
**2回接種**することで  
十分な予防効果が得られます。  
必ず**2回接種**しましょう。



## シングリックス接種後の注意

- ① **接種後30分程度は、接種した施設で安静にしましょう。**  
体調の変化がないことを確認してから帰宅しましょう。
- ② **接種当日は激しい運動を避け、注射部位を清潔に保ってください。**  
接種当日の入浴はさしつかえありません。
- ③ **注射部位の異常な反応や体調の変化を感じた場合は、すぐに医師の診察を受けてください。**

多くの方に注射部位の痛みや腫れがあらわれますが、これは、体内で強い免疫をつくろうとする仕組みが働くためと考えられます。副反応の多くは3日以内で治まりますが、気になる症状があれば、医師にご相談ください。

### 主な副反応

- ・注射部位の症状：痛み、赤み、腫れ
- ・注射部位以外の症状：筋肉痛、疲労、頭痛、悪寒、発熱、胃腸症状

\*シングリックス接種後に他のワクチンを接種する場合は、6日以上あけてください。





# シングリックス筋注用を 接種した方へ

編集協力：独立行政法人 国立病院機構  
東京病院 臨床研究部長  
永井 英明 先生

シングリックスを接種された方  
または代理の方にお渡してください。

**グラクソ・スミスクライン株式会社**

SGNPBROC190004-P1911N 作成年月2019年11月