

ラミクタール錠 25mg

4週目

Grid of 14 empty circles for recording symptoms in week 4.

ラミクタール錠 25mg 服薬指導シート 成人用

ラミクタール錠 25mg

3週目

Grid of 14 empty circles for recording symptoms in week 3.

ラミクタール錠 25mg 服薬指導シート 成人用

ラミクタール錠 25mg

1、2週目

Grid of 14 empty circles for recording symptoms in weeks 1 and 2.

ラミクタール錠 25mg 服薬指導シート 成人用

ラミクタール錠 25mg 服薬指導シート 成人用

- パルプロ酸ナトリウムを服用していない
●カルバマゼピン、フェニトイン、フェノバルビタール、プリモドン、リファンピシン、ロピナビル・リトナビル配合剤を服用していない
●ラミクタールの単剤療法を行っている患者さん用
●ラミクタールの代謝に影響を及ぼさない薬剤との併用療法を行っているもしくは併用している患者さん用

お薬を服用中に、発疹や下記のような症状が現れた場合は、重篤な皮膚障害になる可能性がありますので、医師または薬剤師に相談してください。



このカードをはがして必ず常に携帯してください。

次回の診察時には必ず医師および薬剤師にこのシートをご提示ください

グラクソ・スミスクライン 株式会社

Lamictal

シートでの服薬はこれで終わります。5週目からは通常のお薬シート(PTPシート)での服薬となります。次回の診察時には必ず、医師および薬剤師にこのシートをご提示ください。

Calendar grid for week 4 with dates from 22nd to 28th and checkboxes for medication.

4週目

1日あたり 2錠を1回 または 1錠ずつ2回 服薬してください

次回の診察時には必ず、医師および薬剤師にこのシートをご提示ください。

Calendar grid for week 3 with dates from 15th to 21st and checkboxes for medication.

3週目

1日あたり 2錠を1回 または 1錠ずつ2回 服薬してください

次回の診察時には必ず、医師および薬剤師にこのシートをご提示ください。

Calendar grid for weeks 1 and 2 with dates from 8th to 14th and checkboxes for medication.

2週目 1週目

1日1回1錠を服薬してください

※このカードは必ず常に携帯してください。

患者さんより本カードの提示を受けた医師・薬剤師の先生へ
ラミクタールを服用する患者さんへ
連絡し、医師の指示に従ってください。

●主な副作用は発疹、眠気、めまいです。

●**医師の指示通りに飲んでください。**少ない量から飲み始めて、数週間から数ヶ月かけて治療に必要な量までだんだんと増やしていきます。

●医師から指示された以上の量を飲まないでください。何かの理由でこのお薬を飲むのをやめた場合、医師に相談することなく、飲み始めないでください。

●このお薬を1回飲み忘れた場合、次に2回分のお薬を飲まないでください。

●このお薬以外のお薬（市販のお薬も含む）を飲む場合は、あらかじめ医師または薬剤師にご相談ください。

●体調が良くなったとしても、お薬を飲むのをやめると悪化してしまう可能性もありますので、勝手にお薬をやめないでください。

●このお薬を飲むと眠たくなることがあるので、運転や危険を伴う機械の操作、高所での作業はしないでください。

●このお薬を飲んでいて何か異常を感じたら、医師に相談してください。

○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○

○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○

○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○

カワリツケの医師・薬剤師の連絡先

病医院名

医師名

電話番号

薬局名

電話番号

お名前

電話番号

Lamictal®

カワリツケ・ファーマシューティカル株式会社

※このカードは必ず常に携帯してください。