

下記事項を確認し、処方・調剤をお願いします。

**POINT** 併用している薬剤に応じて投与スケジュールが決まっています

漸増期 維持期 (\*維持用量)

1週、2週 3週、4週 5週 6週 7週目以降

■ バルプロ酸ナトリウムとの併用療法もしくは併用

■ ラミクタールの代謝への影響が不明な薬剤との併用療法  
主な薬剤 (一般名)

- リチウム/オランザピン/アリピプラゾール/カルバマゼピン以外の双極性障害の治療に用いる薬剤

▶ Yes

1週、2週	3週、4週	5週	6週	7週目以降
1回25mg 隔日 (2日に1回)	25mg/日 (1日1回)	50mg/日 (1日1回or 2回に分割)	100* mg/日 (1日1回or 2回に分割)	増量は <b>1週間以上の間隔</b> をあけて <b>最大50mg</b> ずつ <b>最大200mg/日</b> まで (1日1回or2回に分割)

▼ No

■ ラミクタールの代謝を促進する薬剤との併用療法もしくは併用  
(バルプロ酸ナトリウム非併用)

主な薬剤 (一般名)

- カルバマゼピン
- フェニトイン
- フェノバルビタール
- プリミドン
- リファンピシン
- ロピナビル・リトナビル配合剤

▶ Yes

50mg/日 (1日1回)	100mg/日 (1日2回に分割)	200mg/日 (1日2回に分割)	300mg/日 (1日2回に分割)	300*~400* mg/日 (1日2回に分割)
増量は <b>1週間以上の間隔</b> をあけて <b>最大100mg</b> ずつ <b>最大400mg/日</b> まで (1日2回に分割)				

▼ No

■ ラミクタール単剤療法もしくは  
ラミクタールの代謝に影響を及ぼさない薬剤との併用療法もしくは併用  
(バルプロ酸ナトリウム非併用)

主な薬剤 (一般名)


- リチウム
- オランザピン
- アリピプラゾール
- ゾニサミド
- ガバペンチン
- トピラマート
- レベチラセタム
- プレガバリン
- シメチジン
- ペランパネル
- ラコサミド

▶ Yes

25mg/日 (1日1回)	50mg/日 (1日1回or 2回に分割)	100mg/日 (1日1回or 2回に分割)	200* mg/日 (1日1回or 2回に分割)	増量は <b>1週間以上の間隔</b> をあけて <b>最大100mg</b> ずつ <b>最大400mg/日</b> まで (1日1回or2回に分割)
------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------------	--

ラミクタール®錠 添付文書2017年3月改訂(第11版)

## 患者さんそれぞれにあった治療のためのラミクタール3STEP投与



ラミクタール®錠 添付文書2017年3月改訂(第11版)