

ラミクタール錠 25mg

4週目

ラミクタール錠 25mg 服薬指導シート 成人用 ③

ラミクタール錠 25mg

3週目

ラミクタール錠 25mg 服薬指導シート 成人用 ③

ラミクタール錠 25mg

2週目

ラミクタール錠 25mg 服薬指導シート 成人用 ③

ラミクタール錠 25mg

1週目

ラミクタール錠 25mg 服薬指導シート 成人用 ③

医薬品リスク管理計画 (RMP)
LMCM0001-D1509N
改訂年月: 2019年9月


ラミクタール錠 25mg

服薬指導シート 成人用 **B**

- バルプロ酸ナトリウムを服用していない
- ラミクタール®の代謝を促進する薬剤*との併用療法を行っているもしくは併用している患者さん用

*カルバマゼピン、フェニトイン、フェノバルビタール、プリミドン、リファンピジン、ロピナビル、リトナビル配合剤

お薬を服用中に、**発疹や下記のような症状**が現れた場合は、**重篤な皮膚障害**になる可能性がありますので、**医師または薬剤師に相談**してください。



↓このカードをはがして必ず常に携帯してください。

次回の診察時には必ず医師および薬剤師にこのシートをご提示ください

グラクソ・スミスクライン株式会社

Lamictal®

シートでの服薬はこれで終わります。5週目からは通常のお薬シート(PTPシート)での服薬となります。次回の診察時には必ず、医師および薬剤師がこのシートをご提示ください。

4週目

朝 夜

22日目 23日目 24日目 25日目 26日目 27日目 28日目

(朝・夜)

3週目

朝 夜

15日目 16日目 17日目 18日目 19日目 20日目 21日目

(朝・夜)

2週目

8日目 9日目 10日目 11日目 12日目 13日目 14日目

どちらかに○をつけてください(朝または夜)

1週目

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目

どちらかに○をつけてください(朝または夜)

服薬カード

ラミクタール®を服用する患者さんへ

ラミクタール®を飲んで1週間以内に発疹に気づいた場合は、医師または薬剤師に連絡し、医師の指示に従ってください。

かかりつけの病医院以外で診察を受ける場合にも、医師がこのカードを見てください。

患者さんはラミクタール®(一般名:ラモトリキシル)を服用しています。ラミクタール®を服用すると、発疹が起る場合があります。重篤な皮膚障害に進展する場合があります。いかなる発疹であれ発疹が確認されましたら、裏面の医師または薬剤師に相談してください。

※このカードは必ず常に携帯してください。

