

●医療機関名

医薬品リスク管理計画
(RMP)




ラミクタール[®]を 服用される患者さまへ

ラミクタール[®]を服用される患者さまへ

【編集協力】 昭和大学 名誉教授 飯島 正文 先生


お薬を服用中に、^{ほっしん}発疹や^{しょうじょう}下記のような症状が現れた場合は、**すぐに医師・薬剤師に相談してください**



**高熱が出る
(38度以上)**



^{じゅうけつ}
**目が充血
する**



**唇や口内が
ただれる**



**のどが
痛い**



**全身が
だるい**



リンパ節はれる
(首、わきの下、
股の付け根など)



^{ほっしん}発疹に加え^{しょうじょう}上記(右)のような症状が現れた場合、『^{じゅうとく}重篤な皮膚障害(広範囲にわたり赤くなり、やけどのような水ぶくれ、皮膚のはがれ、ただれなどが全身に広がる)』となる可能性があります。

お薬は必ず医師・薬剤師の指示通りに飲んでください

- 自己判断でお薬を中止したり、お薬の量を変えたりしないでください。
- 医師からラミクタール錠の服用を中止するよう指示された場合は、すぐに中止してください。自己判断でお薬の服用を再開しないでください。
- 医師から皮膚科への受診を指示された場合は、皮膚科へ受診してください。

●医療機関名