

POINT

発作型および併用している薬剤に応じて投与スケジュールが決まっています。
 部分発作・強直間代発作・Lennox-Gastaut症候群は併用療法のみ、
 定型欠神発作は単剤療法のみとなります。

- バルプロ酸ナトリウムとの併用療法もしくは併用
- ラミクタールの代謝への影響が不明な薬剤との併用療法
 主な薬剤（一般名）
- カルバマゼピン/プリミドン/フェニトイン/フェノバルビタール以外のてんかんの治療に用いる薬剤

▼ No

- ラミクタールの代謝を促進する薬剤との併用療法もしくは併用
 (バルプロ酸ナトリウム非併用)
 主な薬剤（一般名）
- カルバマゼピン
 - プリミドン
 - フェニトイン
 - リファンピシン
 - フェノバルビタール
 - ロピナビル・リトナビル配合剤


▼ No

- ラミクタールの代謝に影響を及ぼさない薬剤との併用療法もしくは併用
 (バルプロ酸ナトリウム非併用)
 主な薬剤（一般名）
- ゾニサミド
 - シメチジン
 - ガバペンチン
 - リチウム
 - トピラマート
 - オランザピン
 - レベチラセタム
 - アリピプラゾール
 - プレガバリン
 - ペランパネル
 - ラコサミド

- 【定型欠神発作】
- ラミクタール単剤療法



ラミクタール®錠 添付文書2017年3月改訂(第11版)



※部分発作・強直間代発作・Lennox-Gastaut症候群は併用療法のみ、定型欠神発作は単剤療法のみとなります。

ラミクタール®錠 添付文書2017年3月改訂(第11版)