


ザガーロを6ヵ月間服用することで、服用前と比べて、 脱毛部位に**太く長い毛の本数が増える**といった効果が期待できます

ザガーロの服用により、3ヵ月で効果が現れる人もいますが、通常6ヵ月間は飲み続ける必要があります。

「発毛効果」が得られた後に服用を中止すると、髪の毛が再び元の状態に戻ってしまいます。ザガーロは勝手に中止せず、1日1回きちんと飲み続けましょう。



※専門家委員会による写真評価(7段階評価:「著明増加」～「著明減少」)。なお、服用52週後では、「軽度減少」「中等度減少」「著明減少」と評価されたAGA患者は認められませんでした。

注) 紹介した症例は臨床症例の一部を紹介したもので、全ての症例が同様な結果を示すわけではありません。

最近のAGA(男性型脱毛症)治療薬の臨床試験では、治療前と治療後と比較し、明確に数えることができる髪の毛(非軟毛)の本数が増えることを「発毛」と定義しています。

[Tsunemi Y, et al.: J Dermatol, 43(9), 1051-1058 (2016)]

ザガーロの服用中に気をつけていただきたいこと

医師の指示通りに、服用してください

1日1回、1カプセルを毎日忘れずに服用しましょう。
食事の影響を受けないので、いつでも服用できます。



女性や子供は服用しないでください
また、カプセルから漏れた薬剤に触れないでください

カプセルの中の薬剤に触れると、皮膚から有効成分が吸収されてしまいます。
妊娠している女性では、男子胎児の生殖器官等の発達に影響をおよぼす
おそれがあります。

※もし触れてしまったら、すぐに石けんと水で洗い流してください。

カプセルをかんだり、開けたりせずに服用してください

カプセルの内容物は、口やのどの粘膜を刺激する場合があります。

「PSA検査」を受ける際は、ザガーロを服用中であることを
必ず担当医にお伝えください

PSA検査は、「前立腺がん」の有無の目安となる重要な血液検査です。ザガーロは血液中のPSAの量を減少させる作用がありますが、ザガーロ服用中であっても、PSA検査は通常通り受けることができます。



私、ザガーロを
飲んでます

最近のAGA (男性型脱毛症) 治療薬の臨床試験では、治療前と治療後を比較し、明確に数えることができる髪の毛 (非軟毛) の本数が増えることを「発毛」と定義しています。

ザガーロの服用中に起こり得る主な副作用

主に勃起不全、性欲減退、射精障害などがみられます。
これらの副作用は、ザガーロの服用中止後も持続する場合があります。

■主な副作用

	プラセボ (偽薬) (181例)	ザガーロ0.1mg (188例)	ザガーロ0.5mg (184例)
副作用発現例数 (発現率)	27例 (15%)	39例 (21%)	30例 (16%)
生殖系および乳房障害	8例 (4%)	10例 (5%)	14例 (8%)
勃起不全	6例 (3%)	6例 (3%)	10例 (5%)
射精障害	1例 (< 1%)	3例 (2%)	2例 (1%)
精神障害	5例 (3%)	14例 (7%)	4例 (2%)
リビドー (性欲) 減退	2例 (1%)	9例 (5%)	4例 (2%)
胃腸障害	8例 (4%)	6例 (3%)	4例 (2%)
腹痛	2例 (1%)	4例 (2%)	0
臨床検査	5例 (3%)	6例 (3%)	5例 (3%)
精液量減少	0	3例 (2%)	2例 (1%)
感染症および寄生虫症	0	1例 (< 1%)	3例 (2%)
鼻咽頭炎	0	0	3例 (2%)

いずれかの群で発現頻度が2%以上の副作用を記載した。

[ザガーロ承認時評価資料]

いつもと違う症状が現れたら、医師・薬剤師にご相談ください。

ザガーロのはたらき

ザガーロは、AGA (男性型脱毛症) の
原因の1つと考えられる
ジヒドロテストステロン(DHT)という
男性ホルモンの産生を阻害し、
ヘアサイクルを正常に近づけることで、
発毛を促進します。

