

Podcast ACR 2016 – 1

Olá pessoal, meu nome é Frederico Marcondes, sou gerente médico da área de Imuno-Inflamatórios da GSK e vou falar sobre alguns estudos e temas apresentados no ACR 2016, realizado em Washington na última semana e que contou alguns dos principais nomes da Reumatologia Mundial.

Nesse primeiro Podcast vou falar sobre um estudo apresentado pelo Dr. Richard Furie sobre a eficácia e segurança do uso de Belimumabe por 7 anos em pacientes com Lupus Eritematoso Sistêmico que participaram do estudo BLISS-76 nos Estados Unidos e que permaneceram no estudo de acompanhamento de longo prazo.

Para este estudo foram selecionados pacientes dos três braços do estudo BLISS-76 (1mg/kg, 10mg/kg e placebo). Todos os pacientes passaram a dose de 10mg/kg no estudo de seguimento, associado a terapia padrão. Os desfechos incluíam segurança a longo prazo através da frequência de Eventos Adversos e o SDI (índice de acúmulo de dano a órgão) a cada 48 semanas. Outros desfechos avaliados foram o SRI, uso de Prednisona, níveis de células B no sangue e taxa de agudização.

Dos 268 pacientes selecionados, 140 concluíram o estudo. A média do Selena-Sledai inicial era 7.8 e do SDI 1.2. A incidência de Eventos Adversos geral, relacionados ao tratamento e os considerados severos, foi estável ou com declínio no decorrer dos 7 anos. O aumento médio do SDI foi de 0.4. O índice de respondedores foi de 41.9% no primeiro ano, subindo para 75.9% ao final do sétimo ano. Em relação a cada item do SRI ao final deste período, a melhora ≥ 4 pontos no Selena –Sledai foi de 78,2%; 98,4% não apresentaram novos órgãos acometidos pelo BILAG 1A/2B e 93,7% não tiveram piora no PGA. A média de redução das doses de Prednisona foi de 47,1%, a redução dos níveis de células B foi de 83,2% e 20,6% dos pacientes experimentaram algum tipo de agudização severa.

Desta forma, o Belimumabe mostrou-se seguro e bem tolerado, com a incidência de Eventos Adversos mantendo-se estáveis ou reduzidas no decorrer dos 7 anos de acompanhamento. Estes resultados são consistentes com os dados de extensão do Estudo de Fase 2.

Não deixe de acompanhar nosso canal. Para mais informações entre em contato através de nosso site www.gsk.com.br. Te espero na próxima.

Bibliografia:

1. Furie RA et al. 7-Year Safety and Efficacy of Belimumab in Patients with Systemic Lupus Erythematosus [abstract]. Arthritis Rheumatol. 2016; 68 (suppl 10).