

# Dovato

(dolutegravir/lamivudina)

## COMEÇO

O Dovato é indicado para o tratamento do HIV-1 em adultos e adolescentes acima de 12 anos de idade com peso mínimo de 40 kg, sem resistência conhecida ou suspeita à classe de inibidores de integrase, ou lamivudina.


Este folheto foi elaborado para ajudá-lo a ter o melhor começo no Dovato e tem como objetivo responder a quaisquer perguntas que você possa ter. O Dovato vem com seu próprio Folheto de Informação ao Paciente incluído na embalagem. Certifique-se de ler isto cuidadosamente, pois contém informações mais detalhadas.

## COMO FUNCIONA O DOVATO

O Dovato é composto por dois medicamentos diferentes chamados dolutegravir e lamivudina. Dolutegravir pertence a um grupo de drogas HIV chamado de inibidores da integrase (INIs). A lamivudina faz parte de um grupo chamado inibidores de transcriptase reversa de nucleotídeos (NRTIs). Como dolutegravir e lamivudina são dois medicamentos diferentes, eles trabalham de diferentes maneiras para impedir a multiplicação do HIV.

**L** **Lamivudina** impede o HIV de copiar seu material genético depois de ter entrado na célula CD4


**D** **Dolutegravir** funciona impedindo a combinação do material genético do HIV com o da célula CD4



O Dovato é um tratamento para a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV-1, ou "HIV").



Dovato é um regime de tratamento completo que foi prescrito a você por seu médico porque ele acredita que é o melhor tratamento para você.



O Dovato é tomado uma vez ao dia, com ou sem comida.



Os efeitos colaterais mais comuns relatados para a Dovato são dor de cabeça, diarreia e enjoo (náusea).

## COMO TOMAR DOVATO

O Dovato deve ser tomado uma vez ao dia, idealmente à mesma hora do dia a cada dia.

Engula seu comprimido junto com um pouco de água ou suco. O Dovato pode ser tomado com ou sem comida.



## O QUE FAZER SE VOCÊ FALHAR UMA DOSE

Se você acidentalmente falhar uma dose de Dovato, não há necessidade de entrar em pânico.

Se você tiver outra dose de Dovato nas próximas 4 horas, simplesmente pule a dose perdida e tome sua próxima dose no horário regular.


Se você não tiver de tomar outra dose nas próximas 4 horas, basta tomar seu comprimido assim que você se lembrar. Fale com seu farmacêutico se você não tiver certeza.

Se você continuar a falhar doses e não tiver certeza do que fazer, fale com seu médico.

Dovato é composto de dois medicamentos diferentes, chamados dolutegravir e lamivudina, combinados em um único comprimido.

**Cada comprimido Dovato tem esse aspecto:**

Approx 9.5mm



Approx 18.5mm

50 mg dolutegravir  
+  
300 mg de lamivudina

Não tome duas doses ao mesmo tempo para compensar uma dose perdida.



## LEMBRANDO-SE DE TOMAR DOVATO



**Crie um lembrete:** isto pode ser um alarme, um aplicativo ou um alerta de calendário em seu celular.

**Planeje com antecedência:** mantenha sempre medicamentos extras com você, caso você esqueça de tomar sua dose, ou em caso de viagem ou uma mudança em sua rotina.

**Mantenha um diário:** registrar quando você tiver tomado seu remédio. Você também poderia colocar um sinal em um calendário.

**Tente manter seu remédio em um local memorável, mas seguro:** por exemplo, em sua mesa de cabeceira.

Torná-lo rotineiro tomar Dovato como parte de sua rotina matinal ou de dormir pode ajudá-lo a adquirir o hábito de tomar seu remédio à mesma hora todos os dias.

## COMO ARMAZENAR DOVATO

A Dovato não requer condições especiais de armazenamento, mas como com todos os medicamentos, você deve manter a Dovato longe de crianças e animais de estimação.

Certifique-se de não tomar seu Dovato após a data de validade indicada na embalagem. A data de expiração refere-se ao último dia do mês. Por exemplo, uma data de validade de março de 2024 significaria que seus comprimidos expiram em 31 de março de 2024.

## OS POSSÍVEIS EFEITOS COLATERAIS DO DOVATO

Como todos os remédios, o Dovato pode causar efeitos colaterais. É difícil saber se você terá efeitos laterais ou quanto tempo eles vão durar se você fizer - é diferente para todos.

Se você tiver experiência de efeitos ou sintomas colaterais, mesmo aqueles não listados no Folheto de Informação ao Paciente, não deixe de informar sua equipe de saúde para que eles possam ajudá-lo a gerenciá-los.

A lista completa de possíveis folhetos está incluída no Folheto de Informação ao Paciente que veio com seu remédio, mas os mais comuns (afetando mais de 1 em cada 10 pessoas) relatados para o Dovato são:

- diarreia
- sentir-se enjoado (náusea)
- dor de cabeça

Outros efeitos colaterais comuns (afetando até 1 em cada 10 pessoas) relatados para o Dovato são:

- sonhos anormais
- ansiedade
- vômitos
- depressão
- Dificuldade em dormir
- vertigem
- sonolência
- queda do cabelo
- prurido
- dores articulares
- falta de energia
- dores musculares
- erupção cutânea
- dores de estômago
- gases
- ganho de peso

Se você sentir sinais de uma reação alérgica, como inchaço do rosto e da boca causando dificuldades respiratórias, uma erupção cutânea ou uma temperatura alta, consulte um médico imediatamente.

Se você sentir sinais de uma infecção, como febre, dor de cabeça, dor de estômago ou respiração difícil, consulte um médico imediatamente.

Se você tiver algum efeito colateral, fale com seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Isto inclui qualquer efeito colateral possível não listado neste folheto ou no folheto da embalagem do produto.

Você também pode relatar os efeitos colaterais diretamente à HPRa Farmacovigilância em seu website [www.hpra.ie](http://www.hpra.ie).

Ao relatar efeitos colaterais, você pode ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.



## INFORMAÇÕES ÚTEIS



Minha clínica é:

O número de contato da minha clínica é:

O nome do meu médico é:

Meu contato de emergência é:

### Meus próximos compromissos são:

Data	Hora	Com