


 Grupo de edad	 Inmunización primaria	 Intervalo entre dosis primarias	 Dosis de recuerdo
Lactantes de 2 a 5 meses de edad^a	3 dosis	≥ 1 mes	1 dosis entre los 12 y 15 meses ^{b,c}
Lactantes no vacunados de 6 a 11 meses de edad			1 dosis en el segundo año de vida con un intervalo de al menos 2 meses entre la primovacunación y la dosis de recuerdo ^c
Lactantes no vacunados de 12 a 23 meses de edad	2 dosis	≥ 2 meses	1 dosis con un intervalo de 12 a 23 meses entre la primovacunación y la dosis de recuerdo ^c
Niños de 2 a 10 años de edad			
Adolescentes (desde 11 años de edad) y adultos*		≥ 1 mes	No se ha establecido^d

Nota: Todas las dosis son de 0,5ml

^a La primera dosis debe administrarse a los 2 meses de edad. La seguridad y eficacia de Bexsero® en lactantes de menos de 8 semanas no se ha establecido. No se dispone de datos.

^b En caso de retraso en la administración, la dosis de recuerdo no se debe administrar más tarde de los 24 meses.

^c Ver sección 5.1 de ficha técnica. La necesidad y el plazo de otras dosis de recuerdo no han sido determinados.

^d Ver sección 5.1 de ficha técnica.

* No hay datos sobre los adultos mayores de 50 años.